



Klösterl-Apotheke

Rezeptur-Empfehlung

Isopathischer Zecken- und Insektenschutz

IST-Complex Zecken und Insekten I

Apis D6, Borrelia Nos. D6, D10, D12; Fleckfieber Nos. D6, D10, D12; FSME Nos. D6, D10; Q-Fieber Nos. D6, D12, Rickettsia conorii Nos. D15; Rickettsia prowazekii Nos. D15; Viscerale Typhus D3; Zeckenbissfieber Nos. D8, D12 - zu gleichen Teilen

IST-Complex Zecken und Insekten II

Apis D30, Borrelia Nos. D6, D10, D12; Fleckfieber Nos. D6, D10, D30; FSME Nos. D6, D10, D30; Q-Fieber Nos. D6, D12, D30; Rickettsia conorii Nos. D30; Rickettsia prowazekii Nos. D15, D30; Zeckenbissfieber Nos. D8, D12, D30 - zu gleichen Teilen

Nach entsprechender Verrechnung können Globuli (20 oder 50 g) im homöopathischen Labor der Klösterl-Apotheke als Rezepturen angefertigt werden.

Dieses isopathische Komplexmittel entspricht nicht einer Impfung!

Lokale Prophylaxe: Autan Family® mit Mücken- und Zeckenschutz; Wirkdauer ca. 2 - 3 Stunden; Contrazeck®: Wirkdauer ca. 8 Stunden

Für Reisen

<i>vor der Reise</i>	14 Tage Complex I; 3 x 15 Globuli
<i>während der Reise</i>	Complex II 1. Woche täglich 2 x 15 Globuli danach jeden 2. - 3. Tag 2 x 15 Globuli
<i>nach der Reise</i>	4 Wochen Complex II jeden 2. - 3. Tag 2 x 15 Globuli

Langzeitprophylaxe (Februar/März bis Spätherbst)

<i>14 Tage</i>	Complex I: 2 x 15 Globuli täglich
<i>anschließend 7 Tage</i>	Complex II: 2 x 15 Globuli täglich
<i>danach bis zum Spätherbst</i>	Complex II: 1 - 2 x 15 Globuli zunächst jeden 2. Tag, später 1 - 2 x pro Woche, <i>ggfs. ganztäglich</i> <i>Bei erhöhter Infektionsgefahr: tägliche Einnahme empfehlenswert!</i>

Akut nach Stich oder Biss

<i>lokale Anwendung</i>	Complex II: 20 Globuli in etwas Wasser gelöst - im Wechsel mit Rescue®-Tropfen - mehrmals täglich einmassieren
<i>7 Tage</i>	Complex II: 3 - 6 x täglich 15 Globuli - auch parallel zum Antibiotikum!
<i>anschließend</i>	2 x täglich 15 Globuli bis zur Beschwerdefreiheit, danach täglich, ggfs. jeden 2. Tag, später 2 - 1 x pro Woche 1 x 15 Globuli

Bei anhaltender Rötung und Schwellung sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden.

Dosierung für Kinder in der Regel 2 x täglich:

bis 1 Jahr:	5 Globuli
1 - 6 J.:	8 Globuli
6 - 12 J.:	12 Globuli
ab 12 J.:	15 Globuli

Die Globuli werden nichtem 1/4 Stunde vor oder 1/2 Stunde nach den Mahlzeiten eingenommen (ohne Minus im Mund - auch unter der Zunge - einwirken lassen). Ggf. können die Globuli in etwas abgekochtem Wasser aufgelöst werden.

Literaturhinweise

Dr. med. Ingrid Fonk: „Rickettsiose, System- und Hauterkrankungen“ AKSE-Verlag, 2001

FSME-Impfung? - hierzu siehe: M. Hirte „Impfen - pro & contra“, Knauer-Taschenbuch, 2005 (I. Fonk)

Klösterl-Apotheke, Waltherstraße 32 a, 80337 München

Telefon: +49 / 89 / 54 34 32-11, Fax: +49 / 89 / 54 34 32-77

Homöopathisches Labor: Telefon: 54 34 32-19, Fax: 54 34 32-39, e-mail: hom-labor@kloesterl.de

apotheke@kloesterl.de, www.kloesterl-apotheke.de